

Kasvatustalteen

Tuote	N	P	K	S	B	Mg	Zn	Käyttösuositus	Käyttökohde	Tilaus- aikatuu
YaraMila METSÄN NP	25	2			0,3	1	0,1	600–800 kg/ha 6–8 vuoden välein	Kangasmaiden kuusikoiden ja männiköiden lannoitukseen. Sopii myös koivumetsiin. Sisältää booria, joka ehkäisee kasvuhäiriöitä ja fosforia, josta rehevillä mailla on usein puute. Sopii myös boorinpuutoksen korjaamiseen kivennäismaiden kasvatusmetsissä. Levitys lumettomaan maahan.	x
YaraBela METSÄ- SALPIETARI	27		1	4	0,15	1		550–750 kg/ha 6–8 vuoden välein	Kalium- ja booripitoinen typpilannoite, joka sopii parhaiten kangasmaiden männiköihin. Voidaan käyttää myös kuusivaltaisissa metsissä. Levitys keväästä alkusyksyyn.	x
UREA	46							Kangasmailla: 330–430 kg/ha 6–8 vuoden välein. Suometsissä: 150–200 kg/ha 10–15 vuoden välein.	Typpilannoite, joka sopii parhaiten kangasmaiden männiköiden lannoitukseen. Levitys alkusyksystä pysyvän lumen tuloon asti.	

Boorinpuutoksen korjaamiseen

Tuote	N	B	Käyttösuositus	Käyttökohde
YaraVita BORTRAC 150		150 g/l	15–20 l/ha	Levitetään maahan ja/tai aluskasvillisuudelle esimerkiksi reppuruiskua, sumuruiskua tai traktoriruiskua käyttäen. Lisää riittävä vesimäärä jolla varmistetaan tasainen levitys. Levitys koko alalle tasaisesti.